

## 优质双低甘蓝型品种主推技术

**技术概述:**甘蓝型油菜高产栽培技术

**增产增效情况:**用种量比老百姓常规撒播用量减少 40%，产量提升 5%左右，品质表现为双低

**技术要点及注意事项:**

### 一、播前准备

(1) 整地。播前灌水深翻，平整地块；

(2) 施肥。重施底肥，播前每亩撒施进口复合肥 50 公斤左右，硼肥 1 公斤左右以及适量农家肥。

### 二、播种

(1) 播期。适时早播，3 月下旬至 4 月上中旬直播。

(2) 播种方式。条播，行距为 40cm，深度为 3-5cm，播后适当覆土。

(3) 合理密植。每亩播种量 0.3~0.5 公斤，每亩保苗 2.5 万~3.5 万株，注意以密补迟，若土壤墒情差可适度提高播种量。

### 三、田间管理

(1) 科学施肥：追施苗肥，根据苗势每亩施尿素 10 公斤左右；如果底肥没有施硼，应在苔期喷施硼肥（浓度为 0.2%）。

(2) 及时灌水：在出苗期、抽薹期和初花期灌水三次，并进行松土培根。

### 四、病虫害防治

### (1) 病虫害防治

①菌核病。发病期用 50%乙烯菌核利可湿性粉剂有效成分 1000 倍液每 7~10 天喷雾一次，共 3~4 次。

②蚜虫。在蚜虫点片发生区喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2500 倍液或 4.5%高效顺反氯氰菊酯乳油 2000 倍液。根据发生程度防治 2~4 次。

③小菜蛾。选择高效低毒的 20%氯戊菊酯乳油 2000 倍液、2.5%溴氰聚酯 2000 倍液或者 4.5%高效氯氰菊酯乳油 1500 倍液，喷雾时注意做好叶背的喷雾处理。

## 五、适时收获

当田间 80%以上的角果变黄时收获，收获时以早晚有潮气时收割，收获后堆放 10 天左右，然后晾干脱粒，有利于增产增收。

**六、适宜区域：**西藏地区海拔 3900 米以下河谷农区范围均可种植。

## 七、技术依托单位

西藏自治区农牧科学院农业研究所

通讯地址：西藏拉萨市城关区金珠西路 157 号

邮政编码：850000

联系人：唐琳、王晋雄

联系电话：13648989017、18708009889

电子邮箱：tanglinls@163.com    wjxwang9619@163.com